



KAMISTAD® GEL - SCHNELLE SCHMERZLINDERUNG BEI ENTZÜNDUNGEN IM MUNDRAUM

ZAHNFLEISCHBLUTEN ALS ERSTES SIGNAL

Bei mangelnder Mundhygiene vermehren sich Bakterien im Mund, welche Säuren und Giftstoffe ausscheiden und dadurch das Zahnfleisch angreifen. Entzündungen im Mund- und Rachenraum treten meist in Form von Schwellungen und Rötungen auf, die oft sehr schmerzhaft sein können. Das Zahnfleisch ist empfindlich und schon bei normalem Putzen oder der Anwendung von Zahnseide können Blutungen auftreten. Immer wieder auftretendes Zahnfleischbluten ist also ein erstes Warnsignal des Körpers und sollte daher ernstgenommen werden.

Ein anhaltend schlechter Atem oder ein unangenehmer Geschmack im Mund können ebenfalls Folge einer Zahnfleischartzündung sein. Wird diese nicht entsprechend behandelt, entstehen Zahnfleischtaschen, welche als Vorstufe einer Parodontitis gelten, die sich im gesamten Mundraum ausbreiten und sogar den Zahnknochen angreifen und zur Lockerung der Zähne führen können. Da das Zahnfleisch ein wichtiger Teil unseres Zahnhalteapparates ist, sollte es dementsprechend gut gepflegt werden.

TRADITIONELLE UND BEWÄHRTE HILFE

Kamistad® Gel ist eine bewährte Sofort-Hilfe für Entzündungen im Mundraum für Jung und Alt und enthält eine einzigartige 2-fach-Wirkstoffkombination aus Lidocain und Kamille. Das im Gel enthaltene Lidocain lindert den Schmerz und die Kamille wirkt zusätzlich beruhigend und entzündungshemmend. Kamistad® Gel kann bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut sowie bei Aphten eingesetzt werden.

KAMISTAD® GEL

- Einzigartige 2-fach-Wirkstoffkombination aus Lidocain und Kamille
- Stoppt den Schmerz durch Lidocain
- Hemmt die Entzündung durch Kamille
- Fördert die Heilung
- Die Nr. 1* Bei Entzündungen im Mundraum
- Kamistad® Gel ist ein mild wirkendes traditionelles Arzneimittel



WUND IM MUND? GESUND IM MUND

Personen, die häufig an Entzündungen im Mundbereich leiden, sollten also genau auf eine gute Mundhygiene achten. Das betrifft besonders ältere Menschen, da Zahnprothesen ein besonderer Härte-test für die Mundschleimhaut sind. Gerade bei der Neuanpassung von Teil- oder Vollprothesen im Ober- und Unterkieferbereich gibt es oft eine lange Eingewöhnungszeit von mehreren Wochen bis Monaten. In dieser Phase sind Schmerzen und gerötete Druckstellen nicht ungewöhnlich und extrem unangenehm. Ähnliche Probleme können bei Jugendlichen mit einer Zahnspange auftreten, welche die Mundschleimhaut reizen und aufscheuern kann. Auch hier können Druckstellen und Entzündungen die Folge sein. Kamistad® Gel ermöglicht eine punktgenaue Schmerzbehandlung und Entzündungshemmung für Zahnprothesen- und Zahnspangenträger.

URSACHEN FÜR EINE ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNG

Es gibt vielfältige Ursachen für die Entstehung von Zahnfleischbluten oder schmerzhaften Entzündungen im Mund. Allen voran steht eine ungenügende Zahnhygiene mit Zahnstein, Plaque und Kariesbildung unter dem Zahnfleischrand, eine zu harte Zahnbürste, schlecht angepasste Prothesen, Zähneknirschen, Hormonumstellung (z.B. während der Schwangerschaft oder im Klimakterium), Stress und Allergien. Aber auch ein geschwächtes Immunsystem oder ein Vitamin C-Mangel können ursächlich sein.



RAUS AUS DEM TEUFELSKREIS

Das tückische beim Auftreten von Zahnfleischbluten ist, dass das Zahnfleisch beim Zähneputzen dadurch häufig fälschlicherweise geschont wird, was jedoch nur zu einem Teufelskreis führt. Denn dann können sich die Bakterien weiter vermehren und so die Entwicklung einer Parodontose begünstigen. Wichtig ist also die richtige Zahnpflege, um Zahnbelag, Zahnstein und Karies vorzubeugen. Hierfür wird empfohlen die Zähne mehrmals täglich zu putzen (vor allem nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten), die Zahnzwischenräume sorgfältig zu reinigen (z.B. mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen) und regelmäßige Zahnarztbesuche wahrzunehmen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Welche Wirkstoffe sind in Kamistad® Gel enthalten?

Kamistad® Gel enthält einen Auszug aus Kamillenblüten und Lidocainhydrochlorid 1 H₂O. Es lindert somit den Schmerz und fördert die Heilung.

Wie oft pro Tag kann Kamistad® Gel angewendet werden?

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre tragen 3 x tägl. ca. 1/2 cm langen Strang auf. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt. Ohne ärztlichen Rat sollten das Arzneimittel nicht länger als 1 Woche angewendet, wenn keine Besserung der Beschwerden nach dieser Zeit eingetreten ist.

Für wen ist Kamistad® Gel geeignet?

Bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut sowie bei Aphten. Zur Anwendung für Zahnprothesen- und Zahnspangenträger geeignet.

Wann ist ein Besuch beim Zahnarzt ratsam?

Bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches ist die Behandlung mit Kamistad® Gel sowie eine gute Mundhygiene geeignet. Bilden sich jedoch Zahnfleischtaschen oder tritt das Zahnfleischbluten häufig auf, entstehen Schmerzen oder Vereiterungen, ist ein Zahnarztbesuch unbedingt wahrzunehmen.

* IQVIA 05/2020 nach Umsatz und Absatz Stomatologika